

SU TARROCA^B

Nové rekordy ve výnose zrna

Přednosti:

- mimořádně vysoký stabilní výnos
- vysoká plasticita
- dobrá odolnost proti poléhání
- vysoká reakce na intenzitu

Pěstování:

Po delší době se dostává na český trh opravdu rekordně výnosná pšenice s českou registrací, a to v potravinářské "chlebové" kvalitě. Na kontrolní odrůdy dosahuje v průměru účtyhodných 109 % (ošetřená varianta), a to za tři roky státních zkoušek. S odrůdou JOHNSON se tak SU TARROCA řadí mezi nejvýnosnější registrované odrůdy v ČR. SU TARROCA je polopozdní až pozdní odrůda středního až nižšího vzrůstu. Špičkových výnosových výsledků dosahuje zejména kombinací středního počtu klasů na m², vyššího počtu zrn v klase a vysoké HTZ. Dobrá až velmi dobrá odolnost proti poléhání a vysoká reakce na produkční dávku dusíku umožňuje vést odrůdu SU TARROCA na vysoké až velmi vysoké úrovni pěstování. SU TARROCA je však velmi plastickou odrůdou, která snese též nižší hnojení N.

SU TARROCA je bez vyhraněných nároků na pěstování. Velmi dobře však zhodnocuje intenzifikační opatření, jako např. rozdělení produkční dávky N či aplikaci mikroprvků Mn, Mo, Zn. Velmi významné je u odrůdy SU TARROCA navýšení HTZ jako reakce na 2. kvalitativní hnojení močovinou do klasu. Odrůda je i tolerantní k různým termínům setí. Z poloprovozních pokusů vyplývá, že SU TARROCA dosahuje špičkových výnosů též po obilnině, v méně zpracované půdě i v suchých podmínkách na lehčích půdách.

VÝNOS ZRNA	MIMOŘÁDNĚ VYSOKÝ (109 %)
Ideální hustota porostu	střední (600 – 650 klasů/m ²)
Produktivita klasu	vysoká (1,9 g)
Počet nezadinových zrn v klase	vysoký (40 zrn)
HTZ	vysoká (47 – 49 g)

PEKAŘSKÁ JAKOST	B
Pádové číslo	311 s
Obsah NL	13,50 %
Sedimentační test	36 ml
Vaznost mouky	58,5 %
Objemová hmotnost	800 g/l

Šlechtitel: Nordsaat Saatzucht GmbH, Germany

Version: 30.06.2023 / 3.00

SU TARROCA^B

Nové rekordy ve výnose zrna

Objem pečiva

557 ml

Zdroj: registrace ÚKZÚZ

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj

Počáteční vývoj rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost

Výška rostlin



Metání



Zrání



Odolnost

Odolnost vůči pohléhání



Mrazuvzdornost



Porost

Hustota porostu



Počet zrn v klase



HTZ



SU TARROCA^B

Nové rekordy ve výnose zrna

Vývoj:

Počáteční vývoj	rychlý až středně rychlý podzimní vývoj, středně rychlý jarní vývoj / střední odnožovací schopnost								
Výška rostlin									
Metání									
Zrání									

Přezimování:

Zimovzdornost									
Mrazuvzdornost									
Odolnost vůči pohléhání									

Výnos zrna:

Výnos zrna	mimořádně vysoký								
Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									

Odolnost k chorobám:

Běloklasost									
Padlí list									
Padlí klasu									
Braničnatky listu									
Braničnatky klasu									
Rez pšeničná									
Rez žlutá (plevová)									
Fusarium klasu									

SU TARROCA^B

Nové rekordy ve výnose zrna

Termín setí od 2/2 září do 2/2 října

Výsevek:

Rané setí	280 zrn/m ²
Optimální podmínky	280 - 320 zrn/m ²
Pozdní setí	350 - 380 zrn/m ²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem	Hnojení dusíkem - intenzita 160 - 200 kg N/ha - jarní aplikace podzimní podpora EC 14-15 (4.-5. pravý list); močovina + 300g Mn 10kg N/ha - podzimní aplikace Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 50 - 60 kg N/ha (30%) Sloupkování - počátek EC 29 - 31 (počátek sloupkování) 80 - 100 kg N/ha (50%) Sloupkování - vývoj EC 32 - 35 (hlavní sloupkování) 16 - 20 kg N/ha (10%) pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 45 - 49 (praporec až praskání pochvy) 16 - 20 kg N/ha (10%) Hnojení dusíkem - extenzita 100 - 140 kg N/ha - jarní aplikace Odnožování (včetně Nmin) EC 21 - 28 (odnožování) 30 - 40 kg N/ha (30%) Sloupkování - počátek EC 29 - 31 (počátek sloupkování) 60 - 80 kg N/ha (60%) pozdní dávky (dle očekávaného výnosu) EC 45 - 49 (praporec až praskání pochvy) 10 - 15 kg N/ha (10%)
-----------------	---

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření	Dle infekčního stavu EC 30 - 49 širokospektrální fungicid Vysoká intenzita, vyšší infekční stav EC 51 azolový fungicid 200g
---------------------	--

Vhodnost po obilovině	ano (++)
Vhodnost po kukuřici	ne