

HYKING B/C

Král českých polí.



Přednosti:

- Mimořádný výnos zrna 112,6 %
- Ranost
- Zdravá listová plocha
- Vysoká odolnost poléhání

Pěstování:

POPIS HYBRIDU

Raný hybrid pšenice ozimé, který dominuje svým výnosem zrna. Výnos je tvořen zejména velmi vysokým počtem zrn v klasu a střední až vyšší HTZ. Odrůda má velmi dobrou odolnost vůči chorobám, výbornou odolnost poléhání. Má vynikající stresuodolnost.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE HYBRIDU

HYKING je velmi plastický hybrid s tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej pěstovat na bonitně lepších pozemcích v režimu vysoké intenzity, stejně tak i na velmi špatných pozemcích. Pro odrůdu HYKING platí stejné zásady jako pro ostatní hybridní pšenice. Přestože má poměrně široké okno pro setí, doporučujeme včasné setí do hloubky cca 2–3 cm. Při raných termínech setí je samozřejmostí také podzimní ošetření proti přenašečům viróz. Po obilní předplodině je potřeba zvážit ošetření fungicidem s cílem podchytit choroby pat stébel. HYKING má výbornou odolnost proti listovým chorobám a ošetření proto provádějte s ohledem na infekční tlak. Výnos vytváří HYKING převážně délkou klasu (počtem zrn) a HTZ, porost vytváří spíše řidší. Z hlediska výživy proto zajistěte dostatečný přísun dusíku na počátku sloupkování. Produkční hnojení by mělo tvořit cca 50 % celkového normativu, dávka může být dělená. Pro produkci zrna v potravinářské kvalitě je potřeba kvůli přirozeně nižšímu obsahu dusíkatých látek v zrně neopomenout kvalitativní dávku hnojení a obsah NL v zrně podpořit.

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

+++ = vysoký, odolný, velmi pozdní


Vývoj

Počáteční vývoj rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin



Metání



Zrání



Odolnost

Odolnost k přisuškům



Šlechtitel: ASUR PLANT BREEDING SAS, France

Version: 08.06.2017 / 1.00

HYKING B/C

Král českých polí.

Odolnost vůči pohléhání



Mrazuvzdornost



Porost

Hustota porostu



Počet zrn v klase



HTZ



HYKING B/C

Král českých polí.

Vývoj:

Počáteční vývoj rychlý počáteční růst, střední až vyšší odnožovací schopnost

Výška rostlin	
Metání	
Zrání	

Přezimování:

Zimovzdornost	
Mrazuvzdornost	
Odolnost vůči pohlédání	
Odolnost k přisuškům	

Výnos zrna:

Hustota porostu	
Výnos zrna	mimořádně výnosná hybridní pšenice
Počet zrn v klase	

Pekařská kvalita:

HTZ	
Pekařská kvalita	V České republice má Hyking kvalitativní parametry číslo poklesu a vaznost mouky na úrovni E, A. Dusíkaté látky, objemová hmotnost a Zelenyho test na úrovni B, objem pečiva C.

Odolnost k chorobám:

Běloklasost	
Padlí list	
Padlí klasu	
Braničnatky listu	
Rez pšeničná	
Rez žlutá (plevová)	

HYKING B/C

Král českých polí.

Termín setí

od 10. září do 10. října

Výsevek:

Rané setí	110 – 130 zrn/m ²
Optimální podmínky	130 – 160 zrn/m ²
Pozdní setí	nad 160 zrn/m ²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem

Odnožování (včetně Nmin)	EC 21 – 25 (odnožování – jaro)	40 kg N/ha
Tvorba stébla (>60 kg děleně)	EC 31 (1. kolénko)	60 – 120 kg N/ha
	EC 31 – 32 (1. – 2. kolénko)	40 – 60 kg N/ha
Pozdní dávka (dle oček. výnosu)	EC 39 (plný praporec)	30 kg N/ha Při pěstování pro krmné účely lze vynechat.

Potřeba růstových regulátorů

EC 28 (konec odnožování)	CCC 750 g 1,0 – 1,2l/ha
EC 31 (počátek sloupkování) nebo v EC 32	CCC 750 g 0,3 l/ha + 0,3 l Ethephonu čistý trinexapac. ethyl 0,3 l/ha

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření

EC 29 – 32 V případě setí po obilnině podpořit odolnost k stéblolamu účinným fungicidem
 EC 30 – 59 Širokospektrální fungicid dle infekčního tlaku
 EC 61 – 69 Zvážit ošetření přípravkem na bázi azolu

Vhodnost po obilovině	ano (+)
Vhodnost po kukuřici	ne
Odolnost k chlortoluronu	ano