

SU ELLEN Šestiřadý

Machr nejen do aridních oblastí.



Přednosti:

- Vynikající výnos zrna
- Mimořádná ranost
- Výborná tolerance k suchu

Pěstování:

POPIS ODRŮDY

Díky jedinečným vlastnostem uvádíme v předstihu novinku SU ELLEN. **Nejranější ozimý ječmen v sortimentu**, který plně nahradí významné zavedené odrůdy LAVERDA a WENDY. SU ELLEN je středně vzrůstná odrůda se střední odnožovací schopností, s dobrou odolností proti poléhání a mimořádně rychlým naléváním zrna. HTZ je vyšší: přes 48 g.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTITELE ODRŮDY

Odrůda SU ELLEN dosahuje špičkových výsledků i v aridních podmínkách jižního Maďarska. Obdobné výsledky prokazuje v ČR. Velmi vhodná je do lehčích písčitých až kamenitých půd. Dobře si poradí i s bonitně špatnými a méně živinově zásobenými pozemky.

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj									
Počáteční vývoj	rychlý start, střední odnožovací schopnost								
Výška rostlin	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Metání	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zrání	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Odolnost									
Odolnost k přisuškům	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Odolnost vůči poléhání	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mrazuvzdornost	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porost									
Hustota porostu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Počet zrn v klase	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HTZ	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SU ELLEN Šestiřadý

Machr nejen do aridních oblastí.

Vývoj:

Počáteční vývoj	rychlý start, střední odnožovací schopnost								
Výška rostlin									
Metání									
Zrání									

Přezimování:

Zimovzdornost									
Mrazuvzdornost									
Odolnost k přisuškům									
Odolnost vůči pohléhání									

Výnos zrna:

Výnos zrna	vysoký								
Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									
Podíl předního zrna									

Odolnost k chorobám:

Padlí travní na listu									
Hnědá skvrnitost									
Rhynchospor. skvrnitost									
Rez ječná									
Fusaria klasu									

SU ELLEN Šestiřadý

Machr nejen do aridních oblastí.

Termín setí

KVO	20. 9. – 5. 10.
ŘVO a OVO	15. 9. – 30. 9.
BVO	10. 9. – 20. 9.

Výsevek:

Rané setí 280 – 320 zrn/m²

Pozdní setí 320 – 350 zrn/m²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem

Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC ve fázi EC 14 (5 kg N/ha)

EC 21 – 28 (odnožování)	40 – 50 kg N/ha
EC 30 (počátek sloupkování)	40 – 50 kg N/ha
EC 32 (druhé kolénko)	30 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ)	20 – 30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů

EC 32 – 39 (sloupkování – objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu + chlormequatu (0,7 – 1,0 l) nebo 0,4 l/ha trinexapac ethyl nebo v EC 39 ethephone 0,5 l/ha

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření

Postačuje jedno paušální ošetření v EC 37, v případě vyššího infekčního tlaku je vhodné provést ošetření na praporcový list se zaměřením na hnědou skvrnitost.

Vhodnost po obilovině

ano (+)

SU ELLEN Šestiřadý

Machr nejen do aridních oblastí.

SU ELLEN – absolutně nejranější, přesto překonává průměr kontrol

