

NOVIRA Šestiřadý



Přednosti:

- Vysoký výnos zrna i při 100% rezistenci k BaYDV
- Ranost
- Dobrá odolnost k vymrzání

Pěstování:

POPIS ODRŮDY

NOVIRA je nově registrovaná odrůda se 100% rezistencí k virové zakrslosti ječmene. Dosahuje vysokého výnosu zrna i v sušších oblastech pěstování. Společně s SU ELLEN je to nejranější odrůda sortimentu šestiřadého ozimého ječmene. Předností je také velmi dobré zdravé listu i klasu. Rostliny jsou vyššího vzrůstu ovšem s dobrou odolností proti poléhání. NOVIRA patří k odrůdám s dobrou odolností k vymrzání. Kombinací těchto vlastností se stává nyní NOVIRA největší jistotou dobrého výnosu ozimého ječmene pro každého pěstitele.

DOPORUČENÍ PRO PĚSTOVÁNÍ ODRŮDY

NOVIRA najde uplatnění všude tam, kde pěstitel žádá jistotu dobré sklizně ozimého ječmene. V lokalitách s výskytem virové zakrslosti ječmene má farmář dvě možnosti: přestat pěstovat ozimý ječmen nebo zvolit unikátní rezistentní odrůdu NOVIRA. NOVIRA navíc disponuje raností a dobrou odolností k suchu.

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj

Počáteční vývoj středně rychlý start, střední odnožovací schopnost


Výška rostlin



Metání



Zrání



Odolnost

Odolnost k přisuškům



Odolnost vůči pohléhání



Mrazuvzdornost



Porost

Hustota porostu



Počet zrn v klase



HTZ



NOVIRA Šestiřadý

Vývoj:

Počáteční vývoj středně rychlý start, střední odnožovací schopnost

Výška rostlin									
Metání									
Zrání									

Přezimování:

Zimovzdornost									
Mrazuvzdornost									
Odolnost k příuškům									
Odolnost vůči pohléhání									

Výnos zrna:

Výnos zrna vysoký

Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									

Odolnost k chorobám:

Padlí travní na listu									
Hnědá skvrnitost									
Rhynchospor. skvrnitost									
Rez ječná									
Fusaria klasu									

NOVIRA Šestiřadý

Termín setí	KVO: 15. 9. – 5. 10. ŘVO a OVO: 10. 9. – 25. 9. BVO: 10. 9. – 20. 9.
-------------	--

Výsevek:

Rané setí	300 – 320 zrn/m ²
Pozdní setí	320 – 380 zrn/m ²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem	Podzim: 10 kg močoviny jako roztok s CCC 600 – 750 g + 250 l vody ve fázi EC 14
-----------------	---

EC 21 – 28 (odnožování jaro)	5 kg N/ha do 30 kg N/ha
EC 30 (počátek sloupkování)	40 – 60 kg N/ha
EC 32 (druhé kolénko)	40 kg N/ha
EC 39 – 45 (navýšení HTZ)	30 kg N/ha

Potřeba růstových regulátorů	EC 32 – 39 (sloupkování - objevení posledního listu) lze použít přípravky na bázi ethephonu 160 g + chlormequatu 400 g (0,7 – 1,0 l) nebo trinexapac ethyl 250 g – 0,5 l nebo v EC 39 – 43 ethephone 0,5 l/ha
------------------------------	---

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření	Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37 např. epoxiconazolem.
---------------------	--

Vhodnost po obilovině	ano (+)
-----------------------	---------