

BECKENBAUER Šestiřadý

Vyšlechtěno pro rekordní výnosy



Přednosti:

- Rekordní výnosy zrna
- Nepochléhavost
- Mrazuvzdornost

Pěstování:

Předností této odrůdy je velmi dobré zdraví, vysoká odolnost proti poléhání a plastičnost, Tím jsou jasně dány podmínky, kde může být tato odrůda pěstována. Tedy všude. Rekordních výnosů lze s touto odrůdou dosahovat jak extenzitě, tak i při intenzivním způsobu pěstování.

Zkrácený profil:

---- = nízký, náchylný, velmi raný,

++++ = vysoký, odolný, velmi pozdní

Vývoj

Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost

Výška rostlin



Metání



Zrání



Odolnost

Odolnost k přisuškům



Mrazuvzdornost



Porost


Hustota porostu



Počet zrn v klase



HTZ



BECKENBAUER Šestiřadý

Vyšlechtěno pro rekordní výnosy

Vývoj:

Počáteční vývoj rychlý start, střední odnožovací schopnost

Výška rostlin									
Metání									
Zrání									

Přezimování:

Zimovzdornost									
Mrazuvzdornost									
Odolnost k přísuškům									

Výnos zrna:

Výnos zrna velmi vysoký ve všech regionech a úrovních pěstování (1.místo 2017-2019)

Hustota porostu									
Počet zrn v klase									
HTZ									

Odolnost k chorobám:

Padlí travní na listu									
Hnědá skvrnitost									
Rhynchospor. skvrnitost									
Rez ječná									
Fusaria klasu									

BECKENBAUER Šestiřadý

Výšlechtěno pro rekordní výnosy

Termín setí	KVO	20. 9. – 5. 10.
	ŘVO a OVO	15. 9. – 30. 9.
	BVO	10. 9. – 20. 9.

Výsevek:

Rané setí	280 – 320 zrn/m ²
Pozdní setí	320 – 350 zrn/m ²

Hnojení dusíkem:

Hnojení dusíkem	Podzim: 10kg močoviny jako roztok s CCC ve fází EC 14 - 5 kg N/ha		
	Odnožování (včetně Nmin)	EC 21 – 28 (odnožování jaro)	40 - 50 kg N/ha (35 %)
	Tvorba stébla	EC 30 - 31 (počátek sloupkování)	50 – 80 kg N/ha (50 %)
	Pozdní dávka (jen při intenziv. pěstování)	EC 39 – 45 (navýšení HTZ)	20 - 30 kg N/ha (15 %)

Potřeba růstových regulátorů

intenzivní pěstování

EC 30 - 32 (počátek sloupkování)	CCC 750 g 0,7 l + Ethephon 480 g 0,5 l
----------------------------------	--

Fungicidní ošetření:

Fungicidní ošetření	pouze pro intenzivní pěstování - nutno zohlednit infekční tlak
	Fungicidní ošetření odrůdy je s ohledem na její velmi dobré zdraví rentabilní pouze v případě vysokého infekčního tlaku chorob a při vysoké intenzitě hnojení dusíkem. I tak většinou postačí základní ošetření v EC 37.

Vhodnost po obilovině

ano (++)